

Net 100 g

STRESS ADE +

NN: P8SO
Veterinary
Health Product
Produit de
santé animale

Manufactured By:
Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.
61 Malcolm Rd. Guelph, ON N1K1A7
519-822-5333

Distributed By: Bio Agri Mix LP
PO Box 399 / CP 399 Mitchell, ON
N0K 1N0 519-348-9865



Vitamins and Electrolyte Water Soluble Powder for
Chickens, Turkeys and Swine
Poudre hydrosoluble de vitamines et d'électrolytes pour
poulets, dindes, et porcs

Active Ingredients	per/par 100 g:	Ingrédients actifs
Vitamin A	2,256,600 IU	Vitamine A
Vitamin D ₃	561,000 IU	Vitamine D ₃
Vitamin E	1,870 IU	Vitamine E
Vitamin B ₁₂	3740 mcg	Vitamine B ₁₂
Folic Acid	112.2 mg	Acide folique
Thiamine HCl	462.5 mg	Thiamine HCl
Pyridoxine HCl	448.8 mg	Pyridoxine HCl
Calcium d-pantothenate	3,252 mg	D-pantothénate de calcium
Niacinamide	4,488 mg	Niacinamide
Biotin	18,700 mcg	Biotine
Riboflavin	1,122 mg	Riboflavine
Ascorbic Acid	555 mg	Acide Ascorbique
Sodium Chloride	49.3 g	Chlorure de sodium
Sodium Acetate	6.249 g	L'acétate de sodium
Potassium Chloride	12.49 g	Chlorure de potassium
Sodium Bicarbonate	4.166 g	Carbonate de Sodium
Citric Acid	12.52 g	Acide Citrique



Recommended Use: To maintain healthy electrolyte and vitamin levels in chickens, turkeys, and swine during periods of stress due to environmental heat or handling.

Recommended Dose: Chickens, turkeys and swine: Add 100 g of powder to 364 L of drinking water and give for 4 to 6 days.

For automatic proportioner: Prepare the stock solution by dissolving 100 g of powder in 2.73 L of water. Set the apparatus to distribute 30 mL of stock solution per 4 L of drinking water. This will medicate 364 L of drinking water. Prepare fresh solution daily.

Cautions: Do not exceed recommended dose. This VHP may not be incorporated into a mixed feed

Warnings: No withdrawal period is required when used according to the label.

Utilisation recommandée : Pour maintenir des niveaux sains d'électrolytes et de vitamines chez les poulets, les dindes et les porcs pendant les périodes de stress dû à la chaleur ambiante ou à la manipulation.

Dose recommandée : Poulets, dindes et porcs : Ajouter 100 g de poudre à 364 L d'eau de boisson et donner pendant 4 à 6 jours.

Pour doseur automatique : Préparer la solution mère en dissolvant 100 g de poudre dans 2,73 L d'eau. Régler l'appareil pour distribuer 30 mL de solution mère par 4 L d'eau potable. Cela permettra de traiter 364 L d'eau potable. Préparez une solution fraîche tous les jours.

Précautions : Ne pas dépasser la dose recommandée. Ce VHP ne peut pas être incorporé dans un aliment mélangé

Mise en Garde : Aucun délai d'attente n'est requis en cas d'utilisation conforme à l'étiquette.